

CHECKLIST PRONE VENTILATIE COVID-9



- Draai de patiënt **min. met 5 personen**: duid de airway verantwoordelijke aan (tube, tubing, hoofd), duid een leider aan die het draaiproces leidt
 - Is de patiënt voldoende **diep gesedeerd**?
 - Stop sondevoeding** en ontkoppel maagsonde
- 1 airway verantwoordelijke, 1 leider draaiproces**
Curare?
Aspiratie vermijden

Vorbereiding patiënt

- Breng de **oogzalf** in en kleef de ogen dicht
- Breng **een steeklaken in de lengte** onder de patiënt om het draaiproces te ondersteunen

Controleer en verzeker vitale toegangswegen:

- het tubelint – tubebandje
- klever maagsonde
- PU-verband van centraal veneuze catheter (CVC) en arteriële catheter (ev. Swan-Ganz, ECMO, PiCCO, ...)
- Breng **beschermende verbanden** (bij voorkeur klevend silicone-schuimverband waar catheters – leidingen – sondes zullen drukken op de huid in buiklig)
- Centraliseer de noodzakelijke leidingen**: druklijnen, trouses en spuitpompen, tubing en andere leidingen (bv. urinaire sonde) zodat er voldoende marge is om het draaiproces te volgen
- Verwijder of ontkoppel** alle overbodige trouses of leidingen

Allewyn, Biatain, ...

Iemand begeleidt de resterende leidingen

Voorzie:

- 5 extra ECG-elektrodes om nadien meteen aan te brengen
- Een nieuw onderlaken

ECG elektrodes omgekeerd !

Draaiproces

- Draai** de patiënt **beheerst**: ten minste in 2 tijden
 1. Kies een logische draairichting (cfr. leidingen)
 2. Iedereen kent zijn verantwoordelijkheid
 3. Draai de patiënt eerst op de zij
 4. Overdenk de volgende stap
 5. Draai verder op de buik ahv. het steeklaken in de lengte
- Controleer alle **drukpunten** (zie onder)
- Controleer op **afknikken** van vitale toegangswegen: tube, CVC, urinaire sonde, ...

Extra aandacht ET tube en CVC

PRONE VENTILATIE BIJ COVID-19

- hoofd draaien om de 4u OF - hoofd herpositioneren om de 4u	- bescherm de huid waar centraal veneuze catheter contact maakt met de huid (schuimverband)	controle op afknikking urinaire sonde	ontlast de druk op de knieschijf door optie: 1. lamel van matras lossen 2. schuimverband kleven 3. extra zacht kussen 4. knieën te herpositioneren om de 4u	afhangende voeten en normale strekking achillespees door optie: 1. kussen onder scheenbeen en voeten liften zodat ze afhangen 2. voeten over einde van de matras afhangen 3. cellen lossen van alternerende matras
---	---	---------------------------------------	---	---

